

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานควบคุม

โรคเอดส์ เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา ในปี 2552 ซึ่งประกอบด้วย 1. การพัฒนาบุคลากร ทีมงานเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง 2. บุคลากรในโรงพยาบาล

ลดความกังวลต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างมาตรฐานด้านเวชระเบียนสามารถตรวจสอบได้ 4. พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้การดูแลตนเองจากทีมงาน และได้รับ

คำปรึกษาการใช้ยา HIV บวก

โดยเภสัชกรทุกราย

5. มีระบบการส่งต่อและ

เยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องวิธีการประเมิน

โดยใช้การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยตามแนวทางควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ

พบว่า ในปี 2552 มีผู้ป่วยโรคเอดส์รายใหม่เริ่มพบมากขึ้นทะเบียนรักษา 57 ราย ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยรักษาซ้ำหลังจากล้มเหลว การประเมินผลการรักษาในผู้ป่วยรายใหม่เริ่มพบมากขึ้น

57

ราย (HIV ลบ

49

ราย HIV

บวก

8

ราย) เมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น พบว่าเริ่มพบเปลี่ยนเป็นลบหลัง รักษา 2

- 3

เดือน

53 ราย (ร้อยละ

93.0

) เสียชีวิตระหว่างการรักษาระยะเข้มข้น

4 ราย ร้อยละ 7.0 (HIV ลบ 3 ราย

HIV

เขียนโดย Administrator

วันที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:42 น. - แก้ไขล่าสุด วันที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:43 น.

---

บวก

1

ราย) ไม่มีผู้ป่วยขาดยาติดต่อกันนานเกิน

2

เดือน

ส่วนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรักษา พบว่า รักษาหาย

52

ราย (ร้อยละ

91.2

)

รักษาครบ

1

ราย (ร้อยละ

1.8

) รักษาสำเร็จ

53

ราย (ร้อยละ

93.0)

ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษา

4 ราย ร้อยละ 7.0

(

HIV ลบ 3 ราย

HIV

บวก

1ราย) ไม่มีผู้ป่วยขาดยาติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน

ในกลุ่มผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ จำนวน 3 ราย (HIV ลบ 2 ราย HIV บวก 1 ราย) พบว่าเสมหะเป็นลบ เมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น และผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรักษาต่อเนื่อง พบว่า รักษา

หาย

2 ราย (ร้อยละ 66.7

)

เสียชีวิตระหว่างการรักษา เป็นผู้ป่วย

HIV บวก 1 ราย (ร้อยละ 33.3)

เขียนโดย Administrator

วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:42 น. - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:43 น.

---

จากรายงานของสำนักวัณโรค ซึ่งประเมินผลการรักษาของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2550 พบว่า มีอัตราผลสำเร็จการรักษา (Success rate) เพียงร้อยละ ๘

๓

ในปี

2548-

2551

เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา ผลสำเร็จการรักษาเพียงร้อยละ

68.3, 72.๒, 84.3, 86.8 เสียชีวิต

ระหว่างรักษาร้อยละ

19.0,

23.0, 11.8, 13.2

ตามลำดับ ดังนั้นการดำเนินงานวัณโรคของเครือข่ายโรงพยาบาลยะลา จึงเน้นการทำงานเป็นทีม

โดยสหวิชาชีพ ทำให้เกิดกระบวนการดูแลผู้ป่วยวัณโรค การส่งต่อและติดตามผู้ป่วยผด้นอย่างเป็นระบบ ไม่มีผู้ป่วยขาดยาติดต่อกันเกิน

2

เดือน ทำให้ผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดีขึ้นอย่างชัดเจน

และกำลังดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเสมหะบวกเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตระหว่างรักษา

และลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล โดยทำการลดระยะเวลาผู้ป่วยสงสัยวัณโรคออกจากห้องฉุกเฉิน มีระบบทางด่วนส่งตรวจเสมหะ ส่งตัว

ผู้ป่วยสงสัยวัณโรคเข้าห้องแยกโรคให้เร็วขึ้น